



Habla con tu médico acerca de CABENUVA cada dos meses.

Es importante que tu médico sepa cómo es tu vida con el tratamiento para el VIH.

CABENUVA es el único tratamiento inyectable completo recetado de acción prolongada que se usa para reemplazar las pastillas diarias para el VIH en ciertos adultos y adolescentes que tienen la aprobación de su médico.

Responder a estas preguntas puede ayudarte a iniciar la conversación sobre CABENUVA de acción prolongada.

¿Eres indetectable?

- Soy indetectable
- Todavía no soy indetectable

Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio.

¿Qué tanto te interesa el tratamiento de acción prolongada para el VIH?

- Quiero hablar con mi médico
- Estoy abierto a aprender más
- No me interesa

También puede que quieras hablar sobre estas cosas:

- Tu vida con un tratamiento diario para el VIH
- Cómo programar un tratamiento de acción prolongada
- Cambiar de tu tratamiento actual a CABENUVA

¿Qué es CABENUVA?

CABENUVA es un tratamiento completo recetado que se usa para tratar la infección por VIH 1 en personas de 12 años en adelante que pesan al menos 77 libras (35 kg) como reemplazo de su medicamento actual para el VIH 1 cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No recibas CABENUVA si:

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Tomas determinadas medicinas: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifabutin; rifampin; rifapentine; dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis); hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional sobre CABENUVA en la página siguiente.

¿Cómo te sientes acerca de tomar tu(s) pastilla(s) diaria(s) para el VIH?

- Con frecuencia me preocupa mi rutina diaria de pastillas para el VIH
- A veces es un reto mi rutina diaria de pastillas para el VIH
- Estoy cómodo tomando mi pastilla para el VIH todos los días

Si tienes preocupaciones o retos con tu tratamiento diario para el VIH, ¿cuáles son?

Asegúrate de llevar estas respuestas a tu próxima cita con tu médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA?

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua.



CABENUVA

cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen en unos minutos. Los síntomas pueden incluir: dificultad para respirar; estrechamiento de las vías respiratorias; calambres estomacales; sudoración; adormecimiento de la boca; dolor (p. ej., espalda y pecho); sensación de ansiedad; sensación de calor; sarpullido; sensación de aturdimiento o desmayo; cambios en la presión arterial.
- **Problemas hepáticos.** Las personas con antecedentes del virus de la hepatitis B o C, o con determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. También han ocurrido problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:** color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia); orina oscura, similar al color del té; heces (deposiciones) de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; picazón.
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si tienes alguno de los siguientes síntomas:** tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño.

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección; fiebre; cansancio; dolor de cabeza; dolor en los músculos o huesos; náuseas; problemas para dormir; mareo; erupción cutánea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional sobre CABENUVA en la página siguiente.



©2022 ViiV Healthcare or licensor.
CBROGM220086_SPAN July 2022
Produced in USA.

Antes de recibir CABENUVA

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- Alguna vez has tenido una erupción cutánea o reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir o rilpivirine.
- Alguna vez has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis B o C.
- Alguna vez has tenido problemas de salud mental.
- Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto. CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección.
- Estás amamantando o planeas hacerlo. **No amamantes si estás usando CABENUVA.** No debes amamantar si tienes VIH 1, ya que corres el riesgo de contagiarle el VIH 1 a tu bebé. Se desconoce si CABENUVA puede pasar al bebé a través de la leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé durante el tratamiento.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos aquellos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

- Algunos medicamentos interactúan con CABENUVA. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico. **No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informárselo a tu proveedor de salud.**

¿Cómo se me administrará CABENUVA?

- Una vez al mes o cada dos meses, un proveedor de salud te administrará CABENUVA en 2 inyecciones (cabotegravir y rilpivirine), una en cada glúteo.
- Antes de recibir tus primeras inyecciones de CABENUVA, tu proveedor de salud podría darte a tomar 1 pastilla de VOCABRIA (cabotegravir) y 1 pastilla de EDURANT (rilpivirine) una vez al día durante un mes (al menos 28 días) para evaluar tu tolerancia a estas medicinas.
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud durante el tratamiento con CABENUVA. Es importante que asistas a las citas programadas para recibir tus inyecciones.
- Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección programada de CABENUVA por más de 7 días, llama a tu proveedor de salud de inmediato para analizar tus opciones de tratamiento.
- Si interrumpes el tratamiento con CABENUVA, deberás tomar otros medicamentos para tratar tu infección por VIH 1 y reducir el riesgo de desarrollar resistencia viral. Llama a tu proveedor de salud de inmediato para analizar tus opciones de tratamiento.

Te recomendamos que reportes los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Lee la Información para el Paciente de CABENUVA y coméntala con tu proveedor de salud.

Trademarks are property of their respective owners.

