CABENUVA

cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL

extended-release injectable suspensions

¿Has oído del tratamiento inyectable CABENUVA?

Dentro te contamos lo que necesitas saber.

Cada dos meses, y listo.

CABENUVA es administrado por un proveedor de salud en 2 inyecciones, inicialmente con 1 mes de diferencia durante 2 meses. Asiste a todas las citas.

Una forma diferente de tratar el VIH.

6 veces AL AÑO

CABENUVA no es tu tratamiento de todos los días. A diferencia de las pastillas diarias, **es un tratamiento para el VIH completo, de acción prolongada** que puedes recibir 1 vez al mes o cada 2 meses.

Steve
Excursionista
Viajero del mundo
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

Las personas que aparecen viven con VIH y han sido recompensadas por ViiV Healthcare.

¿Qué es CABENUVA?

CABENUVA es un tratamiento completo recetado que se usa para tratar la infección por VIH 1 en personas de 12 años en adelante que pesan al menos 77 libras (35 kg) como remplazo de su medicamento actual para el VIH 1 cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No recibas CABENUVA si:

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Tomas determinadas medicinas: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifabutin; rifampin; rifapentine; dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis); hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

¿Qué hace a CABENUVA diferente?

Es un tratamiento inyectable que **funciona de manera continua para ayudar a mantenerte indetectable* hasta por 2 meses,** dependiendo del plan de tratamiento.

Con inyecciones periódicas, **no tendrás que tomar más pastillas diarias para el VIH†.**

"Ahora que solo recibo mi tratamiento 6 veces al año, ya no tengo que preocuparme de tener que ir a mi casa a tomar una pastilla".

*Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio. Los resultados pueden variar.

† Antes de tus primeras inyecciones, podrías tomar alrededor de 1 mes de pastillas diarias para ver cómo reacciona tu cuerpo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA?

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua.
- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen en unos minutos. Los síntomas pueden incluir: dificultad para respirar; estrechamiento de las vías respiratorias; calambres estomacales; sudoración; adormecimiento de la boca; dolor (p. ej., espalda y pecho); sensación de ansiedad; sensación de calor; sarpullido; sensación de aturdimiento o desmayo; cambios en la presión arterial.

"Tengo dos trabajos, por lo que el tratamiento de acción prolongada realmente funciona con mi estilo de vida".

Karen
Técnico de laboratorio
Mamá orgullosa
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

Haz clic aquí para ver las historias reales de personas como Karen.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Problemas hepáticos.** Se han presentado problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. Las personas con antecedentes de problemas hepáticos o con determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:** color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia); orina oscura, similar al color del té; heces (deposiciones) de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; picazón.

Un tratamiento para el VIH con una rutina flexible

Las inyecciones de CABENUVA las puede administrar un profesional de la salud 1 vez al mes o cada 2 meses, según tu plan de tratamiento.

Para ayudar a mantenerte indetectable, es importante cumplir con tus citas planeadas.

Día de Tratamiento Planeado

Tú y tu médico elegirán el día del mes que mejor funcione de ahora en adelante para tus citas de inyección. A esto se le llamará tu **Día de Tratamiento Planeado.** Si no puedes ir a tu cita, asegúrate de llamar a tu médico de inmediato.

Periodo Flexible de Tratamiento

Tienes un **Periodo Flexible de Tratamiento** en el que hacer tu cita, que abarca desde 7 días antes y hasta 7 días después de tu Día de Tratamiento Planeado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si presentas alguno de los siguientes síntomas:** tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño.

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección; fiebre; cansancio; dolor de cabeza; dolor en los músculos o huesos; náuseas; problemas para dormir; mareo; erupción cutánea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios.

Lo que muestran los estudios clínicos

CABENUVA de acción prolongada ha demostrado que ayuda a mantener a las personas indetectables,*

CABENUVA se puso a prueba en 3 estudios clínicos en los que participaron más de 2,200 personas indetectables que, o bien cambiaron a CABENUVA, o continuaron con su tratamiento para el VIH.

- En 2 estudios, las personas recibieron CABENUVA 1 vez al mes o continuaron con su tratamiento de pastillas diario†.
- En el otro estudio, las personas recibieron inyecciones de CABENUVA 1 vez al mes o cada 2 meses.

En la semana 48 en todos los estudios:

9 de cada 10 personas permanecieron indetectables, ya sea que tomaran pastillas diarias para el VIH o CABENUVA.

Menos del 2% de las personas no permanecieron indetectables (variable principal).

Los resultados fueron consistentes:

- Ya sea con los tratamientos 1 vez al mes o cada 2 meses
- Ya sea que las personas tomaran pastillas de inicio o no antes de comenzar las inyecciones
- En un amplio rango de edades, razas y géneros, incluidas personas transgénero
- Después de 96 semanas

CABENUVA se probó también en **personas de 12 años de edad en adelante que pesan al menos 77 lbs** (35 kg).

*Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio (menos de 50 copias por mL). Los resultados pueden variar.

†Los tratamientos de pastillas diarias contenían dolutegravir y 2 inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos (ITIN) o 2 ITIN más un inhibidor de la proteasa (IP), un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN) o un inhibidor de la transferencia de cadena de la integrasa (ITCI).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Antes de recibir CABENUVA

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- Alguna vez has tenido una erupción cutánea o reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir o rilpivirine.
- Alguna vez has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis B o C.
- Tienes o has tenido problemas renales.
- Alguna vez has tenido problemas de salud mental.
- Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto. CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección.
- Estás amamantando o planeas hacerlo. CABENUVA puede pasar a tu leche materna. Habla con tu proveedor de salud sobre los riesgos para tu bebé de amamantar durante el tratamiento con CABENUVA o después de este.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos aquellos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

- Algunos medicamentos interactúan con CABENUVA. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico. **No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud**.

Efectos secundarios

Los efectos secundarios más comunes reportados en todos los estudios clínicos fueron reacciones en el lugar de la inyección*.

- Del 75% al 83% de los pacientes experimentaron reacciones en el lugar de la inyección.

Globalmente, las reacciones en el lugar de la inyección duraron alrededor de 3 días y en su mayoría fueron de leves a moderadas.

Las reacciones en el lugar de la inyección se reportaron con menos frecuencia cuanto más tiempo estuvieron las personas en tratamiento†.

Además de las reacciones en el lugar de la inyección, los efectos secundarios más comunes que ocurrieron en menos del 9% de las personas fueron:

- Fiebre
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor en los músculos o huesos
- Náuseas
- Problemas para dormir
- Mareo
- Erupción cutánea

Menos del 4% de las personas que recibieron CABENUVA interrumpieron el tratamiento debido a algún efecto secundario‡.

Los resultados pueden variar.

*Las reacciones en el lugar de la inyección incluyen dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, hematomas y calor en el lugar de la inyección.

†La verdadera tasa de reacciones en el lugar de la inyección a lo largo del tiempo puede estar subestimada, ya que es posible que los síntomas que ocurrieron no se reportaran durante el estudio.

‡El 4% de las personas con CABENUVA 1 vez al mes; el 2% de las personas con CABENUVA cada 2 meses.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cómo se me administrará CABENUVA?

- Una vez al mes o cada dos meses, un proveedor de salud te administrará CABENUVA en 2 inyecciones (cabotegravir y rilpivirine), en el músculo de las nalgas.
- Antes de recibir tus primeras inyecciones de CABENUVA, tu proveedor de salud te dará a tomar 1 pastilla de VOCABRIA (cabotegravir) y 1 pastilla de EDURANT (rilpivirine) una vez al día durante un mes (al menos 28 días) para evaluar tu tolerancia a estas medicinas.
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud durante el tratamiento con CABENUVA. Es importante que asistas a las citas programadas para recibir tus inyecciones.
- Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección programada de CABENUVA por más de 7 días, llama a tu proveedor de salud de inmediato para analizar tus opciones de tratamiento.
- Si interrumpes el tratamiento con CABENUVA, deberás tomar otros medicamentos para tratar tu infección por VIH 1 y reducir el riesgo de desarrollar resistencia viral. Llama a tu proveedor de salud de inmediato para analizar tus opciones de tratamiento.

Te recomendamos que reportes los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

Lee la Información para el Paciente de CABENUVA y coméntala con tu proveedor de salud.

Lo que dijeron las personas sobre el cambio a CABENUVA

9 de cada 10 personas prefirieron el tratamiento de acción prolongada de CABENUVA al que cambiaron en lugar de su tratamiento anterior*†‡.

En una encuesta realizada durante los estudios clínicos, se les preguntó a las personas cómo se sentían respecto a su tratamiento, incluyendo cuál preferían. Los resultados son sus opiniones y no implican efectividad clínica.

"Ya no tengo que pensar en las pastillas para el VIH".

Orlando
Amante de la moda
Organizador de eventos
Se mantiene indetectable con CABENUVA
Los resultados pueden variar.

*El 88% de las personas dijeron que preferían CABENUVA 1 vez al mes frente a sus anteriores pastillas diarias para el VIH, el 2% prefirió pastillas diarias para el VIH y el 10% no contestó a la pregunta de la encuesta.

†El 94% de las personas con experiencia previa recibiendo CABENUVA dijeron que preferían inyecciones cada 2 meses frente a sus anteriores inyecciones 1 vez al mes o las pastillas de inicio diarias, el 3% prefirió las inyecciones 1 vez al mes, el 2% prefirió las pastillas de inicio diarias y el 1% dijo no tener preferencia.

‡El 98% de las personas sin experiencia previa recibiendo CABENUVA prefirieron las inyecciones cada 2 meses frente a las pastillas de inicio diarias, el 1% prefirió las pastillas de inicio diarias y <1% dijo no tener preferencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No recibas CABENUVA si:

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Tomas determinadas medicinas: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifabutin; rifampin; rifapentine; dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis); hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA?

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua.

Nadie te conoce como tú te conoces

Comenta con tu médico tus prioridades respecto a tu tratamiento para averiguar si CABENUVA es adecuado para ti.

Habla con tu médico sobre CABENUVA hoy.

Estos son algunos temas que pueden ayudarte a empezar:

- ***Cómo te sientes acerca de tomar pastillas diarias para el VIH***
- ***Qué significaría para ti cambiar a un tratamiento de acción prolongada***
- ***Si eres indetectable*, cómo puedes hacer el cambio a CABENUVA***

Mark
Amante de la naturaleza
Aventurero
Se mantiene indetectable con CABENUVA

Los resultados pueden variar.

*Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen en unos minutos. Los síntomas pueden incluir: dificultad para respirar; estrechamiento de las vías respiratorias; calambres estomacales; sudoración; adormecimiento de la boca; dolor (p. ej., espalda y pecho); sensación de ansiedad; sensación de calor; sarpullido; sensación de aturdimiento o desmayo; cambios en la presión arterial.
- **Problemas hepáticos.** Se han presentado problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. Las personas con antecedentes de problemas hepáticos o con determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:** color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia); orina oscura, similar al color del té; heces (deposiciones) de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; picazón.

Ayuda para pagar CABENUVA

ViiVConnect puede ayudarte a explorar maneras de pagar tus medicamentos recetados de ViiV Healthcare, **ya sea que estés asegurado o no.**

Si calificas, tu copago podría ser de tan solo $0[a].

Una vez que tu médico te recete CABENUVA, puedes inscribirte en ViiVConnect para obtener ayuda:

- Manejando el proceso del seguro.
- Verificando si calificas para programas de ahorros o asistencia que podrían estar disponibles para ti.

Haz clic aquí para descubrir de qué otras formas podría ayudarte ViiVConnect.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CABENUVA? (continúa)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continúa)

- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si presentas alguno de los siguientes síntomas:** tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño.

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, moretones y calor en el lugar de la inyección; fiebre; cansancio; dolor de cabeza; dolor en los músculos o huesos; náuseas; problemas para dormir; mareo; erupción cutánea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios.

ViiVConnect

Conoce las maneras para obtener tus medicamentos recetados de ViiV Healthcare

Revisión del seguro | Programas de asistencia financiera[a]

Llama para hablar con un coordinador de acceso

1-844-588-3288 (línea gratuita)
Lunes a viernes, de 8AM a 11PM (ET)

Obtén ayuda de ViiVConnect

APRENDE MÁS

[a]Sujeto a elegibilidad y a los términos y condiciones del programa. Los programas de ViiVConnect no constituyen un seguro de salud.

Trademarks are property of their respective owners.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

ViiV Healthcare

Pregúntale hoy a tu médico si CABENUVA es adecuado para ti.

Visita es.CABENUVA.com

©2024 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBRWCNT240023_SPAN April 2024
Produced in USA.

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Datos Importantes sobre CABENUVA

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre CABENUVA y no remplaza la conversación con tu proveedor de salud sobre tu condición médica y tu tratamiento.

(KAB-en-ew-vah)

ACERCA DE CABENUVA

CABENUVA es un tratamiento completo recetado que se usa para tratar la infección por VIH 1 en personas de 12 años de edad en adelante que pesan al menos 77 libras (35 kg) con el fin de remplazar su medicamento actual para el VIH 1 cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.

El VIH 1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

CABENUVA contiene 2 medicinas diferentes:

- cabotegravir
- rilpivirine

Se desconoce si CABENUVA es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad o que pesen menos de 77 libras (35 kg).

NO RECIBAS CABENUVA SI

- Alguna vez has tenido una reacción alérgica al cabotegravir o al rilpivirine.
- Estás tomando las siguientes medicinas:
  - carbamazepine
  - oxcarbazepine
  - phenobarbital
  - phenytoin
  - rifabutin
  - rifampin
  - rifapentine
  - dexamethasone (más de un tratamiento de una sola dosis)
  - hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)

ANTES DE RECIBIR CABENUVA

Infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- Alguna vez has tenido una erupción cutánea o reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir o rilpivirine.
- Alguna vez has tenido problemas hepáticos, incluida una infección por hepatitis B o C.
- Tienes o has tenido problemas renales.
- Alguna vez has tenido problemas de salud mental.
- Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada. Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto. CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección.
- Estás amamantando o planeas hacerlo. CABENUVA puede pasar a tu leche materna. Habla con tu proveedor de salud sobre los riesgos para tu bebé de amamantar durante el tratamiento con CABENUVA o después de este.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos aquellos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos herbales. Algunos medicamentos interactúan con CABENUVA. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico cuando compres un nuevo medicamento. Puedes pedirle a tu proveedor de salud o farmacéutico la lista de los medicamentos que interactúan con CABENUVA.

No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud. Tu proveedor de salud puede decirte si es seguro tomar CABENUVA con otros medicamentos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE CABENUVA

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar CABENUVA. **Deja de recibir CABENUVA y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea junto con cualquiera de las siguientes señales o síntomas:**
  - fiebre
  - sensación de malestar general
  - cansancio
  - dolores musculares o en las articulaciones
  - dificultad para respirar
  - ampollas o úlceras en la boca
  - ampollas
  - enrojecimiento o hinchazón de los ojos
  - hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua
- Algunas personas presentan **reacciones** unos minutos **después de recibir la inyección** de rilpivirine. La mayoría de los síntomas desaparecen unos minutos después de la inyección. Los síntomas pueden incluir:
  - dificultad para respirar
  - estrechamiento de las vías respiratorias
  - calambres estomacales
  - sudoración
  - adormecimiento de la boca
  - dolor (p. ej., espalda y pecho)
  - sensación de ansiedad
  - sensación de calor
  - sarpullido
  - sensación de aturdimiento o sensación de que te vas a desmayar
  - cambios en la presión arterial
- **Problemas hepáticos.** Se han presentado problemas hepáticos en personas sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud puede realizar análisis de sangre para evaluar tu función hepática. Las personas con antecedentes de problemas hepáticos o con determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con CABENUVA. **Llama inmediatamente a tu proveedor de salud si presentas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:**
  - color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos (ictericia)
  - orina oscura, similar al color del té
  - deposiciones (heces) de color claro
  - náuseas o vómitos
  - pérdida del apetito
  - dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago
  - picazón

CABENUVA
cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

Datos Importantes sobre CABENUVA (continuación)

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre CABENUVA y no remplaza la conversación con tu proveedor de salud sobre tu condición médica y tu tratamiento.

(KAB-en-ew-vah)

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE CABENUVA (CONTINUACIÓN)

CABENUVA puede provocar efectos secundarios graves, como por ejemplo: (continuación)

- **Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si presentas alguno de los siguientes síntomas:**
  - tristeza o desesperanza
  - ansiedad o inquietud
  - piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño

Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA incluyen los siguientes:

- dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picazón, hematomas y calor en el lugar de la inyección
- fiebre
- cansancio
- dolor de cabeza
- dolor en los músculos o huesos
- náuseas
- problemas para dormir
- mareo
- erupción cutánea

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te asesore con respecto a los efectos secundarios. Puedes reportar los efectos secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

- Habla con tu proveedor de salud o farmacéutico.
- Visita es.CABENUVA.com o llama al 1-877-844-8872, donde también puedes obtener las indicaciones de uso del producto aprobadas por la FDA.

December 2023 CBN:6PIL
Trademarks are property of their respective owners.
©2024 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBRWCNT240023_SPAN April 2024
Produced in USA.

CABENUVA

cabotegravir 200 mg/mL; rilpivirine 300 mg/mL
extended-release injectable suspensions

(KAB-en-ew-vah)

Important Facts About CABENUVA

This is only a brief summary of important information about CABENUVA and does not replace talking to your healthcare provider about your condition and treatment.

ABOUT CABENUVA

CABENUVA is a complete prescription regimen used to treat HIV-1 infection in people 12 years and older who weigh at least 77 lbs (35 kg), to replace their current HIV-1 medicines when their healthcare provider determines that they meet certain requirements.

HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

CABENUVA contains 2 different medicines:

- cabotegravir
- rilpivirine

It is not known if CABENUVA is safe and effective in children younger than 12 years of age or weighing less than 77 lbs (35 kg).

DO NOT RECEIVE CABENUVA IF YOU

- have ever had an allergic reaction to cabotegravir or rilpivirine.
- are taking the following medicines:
  - carbamazepine
  - oxcarbazepine
  - phenobarbital
  - phenytoin
  - rifabutin
  - rifampin
  - rifapentine
  - dexamethasone (more than a single-dose treatment)
  - St John's wort (*Hypericum perforatum*)

BEFORE RECEIVING CABENUVA

Tell your healthcare provider about all your medical conditions, including if you:

- have ever had a skin rash or an allergic reaction to medicines that contain cabotegravir or rilpivirine.
- have ever had liver problems, including hepatitis B or C infection.
- have or ever had kidney problems.
- have ever had mental health problems.
- are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if CABENUVA will harm your unborn baby. CABENUVA can remain in your body for up to 12 months or longer after the last injection.
- are breastfeeding or plan to breastfeed. CABENUVA may pass into your breast milk. Talk to your healthcare provider about risks to your baby from breastfeeding during or after treatment with CABENUVA.

Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements. Some medicines interact with CABENUVA. Keep a list of your medicines and show it to your healthcare provider and pharmacist when you get a new medicine. You can ask your healthcare provider or pharmacist for a list of medicines that interact with CABENUVA.

Do not start taking a new medicine without telling your healthcare provider. Your healthcare provider can tell you if it is safe to take CABENUVA with other medicines.

POSSIBLE SIDE EFFECTS OF CABENUVA

CABENUVA may cause serious side effects, including:

- **Allergic reactions.** Call your healthcare provider right away if you develop a rash with CABENUVA. **Stop receiving CABENUVA and get medical help right away if you develop a rash with any of the following signs or symptoms:**
  - fever
  - generally ill feeling
  - tiredness
  - muscle or joint aches
  - trouble breathing
  - blisters or sores in mouth
  - blisters
  - redness or swelling of the eyes
  - swelling of the mouth, face, lips, or tongue
- **Post-injection reactions** have happened within minutes in some people after receiving their rilpivirine injection. Most symptoms resolved within minutes after the injection. Symptoms may include:
  - trouble breathing
  - narrowing of airways
  - stomach cramps
  - sweating
  - numbness of your mouth
  - pain (e.g., back and chest)
  - feeling anxious
  - feeling warm
  - rash
  - feeling light-headed or feeling like you are going to pass out (faint)
  - blood pressure changes
- **Liver problems.** Liver problems have happened in people with or without history of liver problems or other risk factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver function. People with a history of liver problems or people who have certain liver function test changes may have an increased risk of developing new or worsening changes in certain liver tests during treatment with CABENUVA. **Call your healthcare provider right away if you develop any of the following signs or symptoms of liver problems:**
  - your skin or the white part of your eyes turns yellow (jaundice)
  - dark or "tea-colored" urine
  - light-colored stools (bowel movements)
  - nausea or vomiting
  - loss of appetite
  - pain, aching, or tenderness on the right side of your stomach area
  - itching
- **Depression or mood changes. Call your healthcare provider or get emergency medical help right away if you develop any of the following symptoms:**
  - feeling sad or hopeless
  - feeling anxious or restless
  - have thoughts of hurting yourself (suicide) or have tried to hurt yourself

The most common side effects of CABENUVA include:

- pain, tenderness, hardened mass or lump, swelling, redness, itching, bruising, and warmth at the injection site
- fever
- tiredness
- headache
- muscle or bone pain
- nausea
- sleep problems
- dizziness
- rash

These are not all the possible side effects of CABENUVA. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

GET MORE INFORMATION

- Talk to your healthcare provider or pharmacist.
- Go to CABENUVA.com or call 1-877-844-8872, where you can also get FDA-approved labeling.

December 2023 CBN:6PIL
Trademarks are property of their respective owners.
©2024 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBRWCNT240023 April 2024
Produced in USA.